

Få værdifuld viden med hjem

På apoteket kan vi hjælpe dig med at tage hånd om din sundhed og dit helbred. Vi lægger vægt på, at du får den rigtige rådgivning og vejledning, når du skal forebygge, lindre og behandle. Derfor møder du altid faguddannet personale, som har stor indsigt i apotekets brede produktsortiment. Vi giver os tid, så du kommer i centrum. For os er god service, at du får den hjælp fra apoteket, du behøver. Vil du vide, hvad vi mener? Kom ind på apoteket og få klar besked.



Moxalole™
Anvendes til behandling af kronisk forstoppelse.



Zymelin®
Hurtig og effektiv ved stoppet næse.



Nicotinell®
nikotintyggegummi
Til rygestop eller reducere antal cigaretter. Ny tropisk frugtsmag.



Zovir®
Har du tid til forkølelssår?
Tænk hurtigt – tænk Zovir®.

SB12
Sikker ånde i 12 timer.
Netop nu – få 50 ml. ekstra.



Søg viden, find viden

Klik ind på vores hjemmeside og hent værdifuld viden. Læs artikler om alt fra lus, over D-vitamin og til rygeafvænning med gode råd. Stil spørgsmål og få svar i vores elektroniske brevkasse. Læs om dit lokale apotek. Gå ind på hjemmesiden på www.apotekeren.dk

Her indsættes apotekets navn

Adresse nr. · Postnr./By
Tlf. XX XX XX XX

Kom i centrum

På vores apotek giver vi os tid til at lytte, spørge ind til dine symptomer og rådgive dig professionelt. Vi har opstillet en række servicemål for apoteket med det ene formål, at give dig den bedste service og betjening.

Velkommen på apoteket.

Venlig hilsen
APOTEKERNAVN, Apoteker

HER INDSÆTTES
BILLEDE AF
LOKAL APOTEKER

Produktinformation: Moxalole® anvendes ved forstoppelse. Kronisk obstruktion og svær obstruktion med ophobning af fæces i rectum og/eller colon. **Dispenseringsform:** pulver til oral opløsning. 1 brev indeholder 46,6 mg kaliumchlorid, 13,125 g macrogol 3350, 350,7 mg natriumchlorid og 178,5 mg natriumhydrogencarbonat. **Doseringsforslag:** Kronisk obstruktion: Voksne. 1 pulver 1-3 gange dagligt. Ved behandlingen bør normalt højst være 2 venter, men kan gentages. Lægerens behandling kan være nødvendig ved neurologiske sygdomme og ved behandling med obstruerende lægemidler. **Kontraindikationer:** ileus og mistanke om ileus, gastro-intestinal perforation, svær colitis, toksisk megacolon, ventrikeltømmingsforstyrrelse. **Bivirkninger:** Almindelige: Kvalme, opkastning, abdominalsmerter, meteorisme, diarré, flatulens. Meget sjældne Allergiske reaktioner, herunder hududslæt, angioødem og anafylaktisk reaktion. **Graviditet:** Kan om nødvendigt anvendes. Den systemiske absorption er ringe. **Anning:** Kan anvendes. Den systemiske absorption er ringe. **Pakninger:** Moxalole 8 stk., 20 stk., 50 stk., 100 stk. Meda OTC, Postboks 898, 1532 København. Tlf 70 2003 62 www.antula.dk Få samtlige pligtoplysninger og information ved henvendelse til apotekspersonalet. **Zovir® (aciclovir).** Anvendelse: Anvendes til behandling af tilbagevendende forkølelssår (herpes labialis) på munden og i ansigtet. **Dosering:** Voksne og børn over 2 år. Påføres det angrebne område 5 gange dagligt med cirka 4 timers mellemrum, undtagen om natten. Behandlingen bør fortsættes i mindst 4 dage. Hvis heling herefter ikke er sket, kan behandlingen fortsættes i op til 10 dage. Hvis såret da ikke er helet, bør man kontakte lægen. **Forsigtighedsregler:** For at undgå irritation må Zovir creme ikke anvendes på slimhinder (f.eks. i munden, i vagina og i øjnene). **Bivirkninger:** Almindelige: Mild udtørring og afskalning af huden. Ikke almindelige: Forbigående svie eller brændende fornemmelse, kløe. **Graviditet og anning:** Kan anvendes. **Pakningsstørrelser:** Zovir 5% creme tube 2g, Zovir 5% creme pumpe 2g, Zovir 5% creme tube 2g, Zovir 5% creme pumpe 2g. **Nicotinell** indeholder nikotin. **Virkning:** Lindrer symptomer i forbindelse med tobaksafvænning eller rygereduktion. **Dosering:** Ved et cigarettforbrug under 20 dagligt anvendes 2 mg tyggegummi. Den anbefalede daglige dosis afhænger dog af rygeafhængighed. 4 mg bør bruges ved stærk nikotinafhængighed, eller hvis rygeophor ikke er lykkedes efter anvendelse af 2 mg. Ellers skal 2 mg anvendes. 1 tyggegummi ved rygestrang, hver 1-2 timer, dog maksimalt 25 tyggegummi af 2 mg og maksimalt 15 af 4 mg tyggegummi per dag. Efter 2-4 måneder nedsættes forbruget. Behandlingen bør afsluttes, når forbruget er nedsat til 1-2 stykker om dagen, som regel efter 6 måneder. Brug under 1 år anbefales ikke. Indtagelse af kaffe og syrlige drikke bør undgås 15 minutter før, tyggegummiet anvendes. **Bivirkninger:** Der kan forekomme irritation i mund eller hals, svimmelhed, hovedpine, hikke, ondt i kæben, øget spyttproduktion og mave-tarmgener. Ikke almindeligt ses hjertebanken, hudrødme og nældefeber. Sjældent ses allergiske reaktioner samt alvorligt svækket nyre og/eller lever. **Forsigtighedsregler:** Bør ikke anvendes af børn under 18 år uden lægens anvisning. Nikotin kan fremkalde irritation i mund og hals, svimmelhed, hovedpine, hikke, ondt i kæben, øget spyttproduktion og mave-tarmgener. Ikke almindeligt ses hjertebanken, hudrødme og nældefeber. Sjældent ses allergiske reaktioner samt alvorligt svækket nyre og/eller lever. **Indeholder Sorbitol (E420) og Malitol (kun Nicotinell Classic) og bør derfor ikke anvendes til patienter med arvelig fruktoseintolerans. Indeholder natrium, hos patienter der er på kontrolleret natrium diæt, skal der tages hensyn til dette. Gum-basen indeholder butylhydroxytoluen (E321), som kan forårsage lokalirritation af slimhinderne. Bør ikke anvendes uden anbefaling fra lægen ved graviditet og anning, da risikoen ved behandling må afvejes over for risikoen ved fortsat rygning. **Pakningsstørrelser og vejledende priser per 31. oktober 2011:** Nicotinell tyggegummi: Tropical Fruit: 2 mg: 24 styk: 47,95 kr.; 204 styk: 255,10 kr.; 4 mg: 204 styk: 343,85 kr.; IceMint: 2 mg: 24 styk: 47,95 kr.; 96 styk: 149,95 kr.; 204 styk: 264,95 kr.; 4 mg: 24 styk: 64,95 kr.; 96 styk: 194,95 kr.; 204 styk: 354,95 kr.; Classic: 2 mg: 24 styk: 47,95 kr.; 204 styk: 205,50 kr.; 4 mg: 204 styk: 306,30 kr.; Mint og Lakrids: 2 mg: 24 styk: 47,95 kr.; 96 styk: 138,35 kr.; 204 styk: 255,10 kr.; 4 mg: 24 styk: 62,80 kr.; 96 styk: 187,30 kr.; 204 styk: 343,85 kr.; Nicotinell Mint: 300 styk: 324,95 kr.; Fruit: 2 mg: 24 styk: 34,05 kr.; 96 styk: 114,75 kr.; 204 styk: 205,50 kr.; 4 mg: 24 styk: 46,15 kr.; 96 styk: 155,05 kr.; 204 styk: 276,05 kr. **Inden brug af produktet, bør vejledningen i og på pakningen læses grundigt.** Novartis Consumer Health – tlf. 39 16 84 00 – www.nicotinell.dk. Dato for produktresumé: Tyggegummi 02/2010. **Zymelin®** Ukonservet (xylometazolinhydrochlorid), næsespray og næsedråber. **Virkning:** Mindsker hævelse af næseslimhinden ved betændelse i bihule eller næseslimhinde. **Dosering:** Zymelin® Ukonservet næsespray og Zymelin® Næsedråber: Voksne og børn over 10 år: Næsespray 1 mg/ml. 1 pust i hvert næsebor højst 3 gange dagligt i højst 10 dage. Bør ikke anvendes til børn under 10 år uden lægens anvisning. Børn 2-10 år: Næsespray 0,5 mg/ml. 1 pust i hvert næsebor højst 3 gange dagligt i højst 10 dage. Zymelin® Næsedråber: Voksne og børn over 10 år: Næsedråber 1 mg/ml. 2 dråber i hvert næsebor højst 3 gange dagligt i højst 10 dage. Bør ikke anvendes til børn under 10 år uden lægens anvisning. **Må ikke anvendes:** Ved overfølsomhed overfor xylometazolinhydrochlorid eller et eller flere af hjælpestofferne samt ved grøn stær med snævre kammervinkel. **Forsigtighedsregler:** Bør ikke anvendes til børn under 2 år uden lægens anvisning på grund af risiko for overdosering og depression af centralnervesystemet. Bør ikke anvendes i mere end 10 dage, da hyppig og langvarig brug kan medføre hovedpine og øget sekretion. Skal anvendes med forsigtighed af personer, der er følsomme over for adrenerge substanser. Skal anvendes med forsigtighed og kun efter lægens anvisning ved forhøjet stofskifte (hyperthyroidisme), sukkersyge, forhøjet blodtryk, åreforkalkning, aneurismer, iskæmisk hjertesygdom, uregelmæssig hjertefrytme, vandladningsbesvær på grund af forstørret blærehalskirtel (prostata), ved behandling med MAO-hæmmere og andre lægemidler, der kan forhøje blodtrykket samt ved svulst i binyrerne (føækromocytom). **Graviditet og anning:** Graviditet: Bør ikke anvendes. Anning: Bør kun anvendes efter lægens anvisning. **Bivirkninger:** Almindelige: Svie i næse og svælg. Tor og irriteret næseslimhinde. Nysen. Slimproduktion i næsen. Ikke almindelige: Tilstoppet næse. Sjældne: Ubehag i mave-tarmkanalen. **Pakninger:** Næsespray 1 mg/ml 10 ml og 2 x 10 ml. Næsespray med menthol 1 mg/ml 10 ml. Næsespray 0,5 mg/ml 10 ml. Næsedråber 1 mg/ml 10 ml. **Læs vejledningen i pakningen omhyggeligt.** Nycomed Danmark ApS, Langebjerg 1, 4000 Roskilde. Tlf.: 46 77 11 11. Fax: 46 75 48 42. Internet: www.nycomed.dk**

apotek